

第十五改正日本薬局方正誤表において、アドレナリン（エピネフリン）の IUPAC 名が変更されておりますので、Let's CBT の以下のページにつきまして変更をお願い致します。

◇ ZONE1 ◇

162 ページ

変更前 (アドレナリン)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IUPAC名</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">置換基 (接頭語)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> (1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol </td> </tr> </table>	IUPAC名			置換基 (接頭語)	+	語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)							(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol		
IUPAC名																
置換基 (接頭語)	+	語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)														
(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol																
変更後 (アセトアミノフェン)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IUPAC名</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">置換基 (接頭語)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide </td> </tr> </table>	IUPAC名			置換基 (接頭語)	+	語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)							N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide		
IUPAC名																
置換基 (接頭語)	+	語幹 (最長の炭素鎖) + 語尾 (最も優先順位の高い官能基)														
N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide																

164 ページ

変更前	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">アドレナリン (エピネフリン)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1R)-1-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino) ethanol</td> </tr> </table>	アドレナリン (エピネフリン)		(1R)-1-	(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino) ethanol
アドレナリン (エピネフリン)					
(1R)-1-					
(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino) ethanol					
変更後	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">アドレナリン (エピネフリン)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-[(1R)-1-Hydroxy-2-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(methylamino)ethyl] benzene-1,2-diol</td> </tr> </table>	アドレナリン (エピネフリン)		4-[(1R)-1-Hydroxy-2-	(methylamino)ethyl] benzene-1,2-diol
アドレナリン (エピネフリン)					
4-[(1R)-1-Hydroxy-2-					
(methylamino)ethyl] benzene-1,2-diol					

薬物治療ガイドラインが変更されておりますので、Let's CBT の以下のページにつきまして変更をお願い致します。

◇ ZONE2 ◇

P184

訂正箇所	訂正前	訂正後
7) 治療 1 行目	第一選択薬は NSAIDs である。	第一選択薬は メトトレキサート である。
7) 治療 (表内) 1.NSAIDs	・ RA の第一選択薬である。	削除