



誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇POINT BOOK 1 化学系

ページ	箇所	訂正前	訂正後
7	3) 窒素 <結合>	sp ² 混成軌道と sp 混成軌道からなる～	sp ² 混成軌道と sp ² 混成軌道からなる～
84	問4 解答	b	d
145	問15 解説b 反応式		
219	3) 慣用名	acethoxy	acetoxy
385	ファクター 直接法	$f = \frac{1000}{VMn}$	$f = \frac{1000m}{VMn}$

◇POINT BOOK 2 生物系

ページ	箇所	訂正前	訂正後
48	問6 問題	正しいものを2つ選べ	誤っているものを1つ選べ
48	問7 問題	正しいものを2つ選べ	正しいものを1つ選べ
49	問6	解答 a・c 解説 d ×	解答 b 解説 d ○
49	問7	解答 a・c 解説 d ○	解答 a 解説 d ×
297	問7 問題	d すべての遺伝子情報が得られる。	d すべての遺伝子情報は得られない。
432	問8-1	正しいものを2つ選べ。	正しいものを1つ選べ。
433	問8-1	解答 c・d 解説 d ○	解答 c 解説 d ×

◇POINT BOOK 3 物理系・薬剤系

ページ	箇所	訂正前	訂正後
238	問3問題	誤っているものを2つ選べ。	誤っているものを1つ選べ。
239	問3解答	解答 a・c	解答 a
239	問3解答	c ×	c ○

◇POINT BOOK 5 衛生・法規・制度

ページ	箇所	訂正前	訂正後
49	問5解説	過酸化作物価 = $\frac{4.9 \times 1000}{0.8} \times 10$	過酸化作物価 = $\frac{4.9 \times 1,000}{0.8} \times 10$
251	問30 解説b	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジ オキシン (2,3,7,8-TCDD)	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン (2,3,7,8-TCDF)
573	問1-1 解説c	～鉄推奨量は 10.5g/日で、同年齢男 性の 7.5g/日よりも多い。	～鉄推奨量は 10.5mg/日で、同年齢男性の 7.5mg/日よりも多い。
410	問23 問題	誤っているものを2つ	誤っているものを1つ
411	問23 解答	解答 a・c	解答 b

411	問23 解説	解説 a : ×	解説 a : ○
411	問23 解説	解説 b	解説 b 削除
411	問23 解説	解説 c	設問 b の解説
411	問23 解説	解説 d	設問 c の解説
411	問23 解説	解説 e	設問 d の解説
417	問3 解説	解答 e	解答 a
478	問4 問題	正しいものを2つ	正しいものを1つ
479	問4 解説	b○ :	b× :
542	問1 選択肢	bGCP	bGLP
583	問1-1 解答	解答 b・c	解答 b・d
588	問14-1 選択肢	c 薬剤師～	削除
588	問15-1 問題文	誤っているものを1つ	誤っているものを2つ
590	問16-1 選択肢	c 薬剤師～	削除

◇POINT BOOK6 製剤学・実務

ページ	箇所	訂正前	訂正後
104	問3問題	誤っているものを1つ選べ。	誤っているものを2つ選べ。
105	問3解答	解答 : b	解答 : b・e
105	問3解答	e : ○ ナファモスタットメシル酸塩注射用は、ブドウ糖注射液と配合変化を起こし白濁する。	e : × ナファモスタットメシル酸塩注射用は、生理食塩液と配合変化を起こし白濁する。ブドウ糖注射液と混合しても問題ない。
144	問5問題	酸化マグネシウムが低用量～	酸化マグネシウムが高用量～