

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇POINT BOOK 2 生物系

ページ	行数	訂正前	訂正後
46	問6問題	～正しいのはどれか。 <u>2つ</u> 選べ。	～誤っているのはどれか。 <u>1つ</u> 選べ
	問7問題	～正しいのはどれか。 <u>2つ</u> 選べ。	～正しいのはどれか。 <u>1つ</u> 選べ。
47	問6解答	4 <b>×</b>	4 <b>○</b>
	問6解答	解答： <u>1・3</u>	解答： <u>2</u>
	問7解答	4 <b>○</b>	4 <b>×</b>
	問7解答	解答： <u>1・4</u>	解答： <u>1</u>
89	問2解答	1 <b>×</b> ：ゴナドトロピンは視床下部～	1 <b>×</b> ：ゴナドトロピンは <u>下垂体</u> ～
91	問7解答	5 <b>×</b> ：～ <u>ペプチド</u> ホルモンである。	5 <b>×</b> ：～ <u>アミン・アミノ酸</u> ホルモンである。
ページ	行数	訂正前	
96			
ページ	行数	訂正後	
96			
ページ	行数	訂正前	訂正後
166	問35	解答： <u>4</u>	解答： <u>2</u>
254	問5解答	解答： <u>5</u>	解答： <u>1</u>

◇POINT BOOK 3 物理系・薬剤系

ページ	行数	訂正前	訂正後
71	問5解答	解答：4	解答：5
199	問6解説	3 ○：(中略)摩擦が増大し、粘度が低下する。	3 ○：(中略)摩擦が増大し、粘度が増大する。
333	問15問題	このぜん息患者に～	このぜん息患者(体重65kg)に～

◇POINT BOOK 4 薬理・薬物治療

ページ	行数	訂正前	訂正後
41	問7解答	3 ×：消化管運動を促進する。	3 ×：消化管運動を抑制する。
119	問1解答	3 ○：ヒドロクロロチアジドはループ利尿薬であり、～	3 ○：ヒドロクロロチアジドはチアジド系利尿薬であり、～
415	問1解答	2 ×：カルシトニン製剤は、中枢のセロトニン神経を介した鎮痛作用をもつため、骨粗鬆症の骨痛に有効である。	2 ×：メナテロレノンはビタミン K <sub>2</sub> 製剤であり、脂溶性である。したがって食後投与の方が吸収が良い。
453	問8解答	<p>解答：1・2</p> <p>1 ×：シスプラチンは腎排泄型薬物である。クレアチニンクリアランスが 30 mL/min 以下の患者には投与禁忌である。</p> <p>2 ×：シスプラチン投与によって生じる難聴は高音域の障害である。</p> <p>3 ○：ドキシルビシンの注意すべき副作用として、心筋障害がある。心疾患を有する患者には投与禁忌である。</p> <p>4 ○：イホスファミドによる出血性膀胱炎は、イホマイド及びエンドキサンの尿中代謝物アクロレインによって誘発される。メスナはアクロレインの二重結合に付加し、無害な付加体を形成することで出血性膀胱炎を抑制すると考えられている。</p> <p>5 ○：L-アスパラギナーゼは、脳出血、脳梗塞、肺出血等の重篤な凝固異常(フィブリノゲン減少、プロトロンビン減少、プラスミノゲン減少、アンチトロンビンⅢ減少、プロテインC減少など)が現れることがあるため、頻回に血液凝固能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には休薬又は中止する。L-アスパラギナーゼは、血中のL-アスパラギンを分解しアスパラギン要求性腫瘍細胞を栄養欠乏状態にすることで抗腫瘍効果を発揮するため、急性リンパ性白血病などのリンパ性悪性疾患に用いられる。</p>	<p>解答：4、5</p> <p>PSA(前立腺特異抗原)の高値と排尿困難、血尿などの症状から前立腺癌であることがわかる。また、所属リンパ節の腫大や骨盤、腰椎に硬化性病変が認められることから、リンパ節転移、骨転移も生じている。前立腺癌の症状は、前立腺肥大症と類似しており、排尿困難や夜間頻尿、尿意切迫感などを認める。骨転移がある場合には、腰痛で発見されることがある。</p> <p>1 ○：前立腺癌は、テストステロン(男性ホルモン)依存性の悪性腫瘍である。</p> <p>2 ○：前立腺癌は前立腺外腺に発生する悪性腫瘍である。</p> <p>3 ○：前立腺癌などの悪性腫瘍性疾患の確定診断は、生検によって行われる。</p> <p>4 ×：放射線療法は、多発性骨転移に伴う疼痛軽減や運動機能の保持を目的に行われることがある。</p> <p>5 ×：前立腺全摘除手術は、前立腺癌の根治を目的とした治療であり、転移のない限局性前立腺癌に対して行われる。本患者はリンパ節転移、骨転移があるため、本治療の適応とはならない。</p>
462	問3	～正しいのはどれか。	～誤っているのはどれか。
463	問3解答	1・4	2・5
463	問3解答	3 ×	3 ○

## ◇POINT BOOK 5 衛生・法規・制度

ページ	行数	訂正前	訂正後
152	6行目 (表中)	女性 95cm 以上	女性 90cm 以上
152	9行目 (表中)	ヘモグロビン A <sub>1c</sub> 値 5.5%以上	空腹時血糖 110mg/dL

## ◇POINT BOOK 6 製剤学・実務

ページ	行数	訂正前	訂正後
19	表中	吸水軟膏	吸水クリーム (吸水軟膏)
		親水軟膏	親水クリーム (親水軟膏)
33	問6 解説1	フェノール及びクレゾール	濃グリセリン