

第 100 回薬剤師国家試験過去問題集(演習型解説書)訂正表 (第 1 刷)

2018 年 6 月 29 日現在

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇必須問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
29	問 23	解説 3	代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、塩素原子を有するため、 <b>特定フロンに比べ</b> 弱いながらもオゾン層を破壊する。	ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、塩素原子を有するため、オゾン層を破壊する。
	関連問題	問題 2 解説	代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、分子内に塩素原子を含むため、特定フロンに比べ弱いながらもオゾン層破壊を起こす。	<b>特定フロン</b> であるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、分子内に塩素原子を含むため、特定フロン <b>のクロロフルオロカーボン(CFC)</b> に比べ弱いながらもオゾン層破壊を起こす。
30		問題 5 解説 3 行目	代替フロン <u>のウ</u> (CHF <sub>2</sub> Cl) となる。	<b>特定フロン</b> のウ (CHF <sub>2</sub> Cl) となる。

◇理論問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
131	問 102	解説 3 行目	1-methylcyclohexene	1-methylcyclo <b>pent</b> ene
			<i>trans</i> -2-methylcyclohexanol	<i>trans</i> -2-methylcyclo <b>pent</b> anol
150	問 109	解説 4	文章を差し替え	Dはリュウタンである。リンドウ科トウリンドウの根及び根茎を基原とし、苦味健胃薬として利用される。また、ボタン科ボタンの根皮を薬用部位とした生薬がボタンビであり、鎮痛薬、鎮痙薬として利用される。
172	Exercise	解答	lgE:⑥・⑨・⑫	lgE:⑥・⑨ ※⑫を削除
261	Exercise	Exercise	完全ヒト型可溶性 TNF- $\alpha$ /LT $\alpha$ <b>セレプター</b>	完全ヒト型可溶性 TNF- $\alpha$ /LT $\alpha$ <b>レセプター</b>
262	Exercise	穴埋め	エファビレンツ	<b>ネルフィナビル</b>

◇実践問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
249	Exercise	解答	⑥ 5-HT <sub>1A</sub>	⑥ シヒドロピリジン系
327	問 198	問題 5 行目	包接化の平衡定数 (M <sup>-1</sup> )	包接化の平衡定数 (L・mol <sup>-1</sup> )
331	問 201	問題 4 行目	また (①) の減少	また (①) の現象
364	問 218-219	設問 7 行目	ボグリボース錠 0.3mg 1 日 3 回朝昼夕食後	ボグリボース錠 0.3mg 1 日 3 回朝昼夕食直前
		設問 8 行目	メトホルミン錠 250mg	メトホルミン塩酸塩錠 250mg
368	問 220-221	設問 9 行目	14 日	14 日分
		設問 12 行目	朝昼夕食後	朝昼夕食前 14 日分
489	問 292	設問 1 行目	トラフ濃度は 60 μg/dL	トラフ濃度は 60 μg/mL