

ページ	箇所	訂正前	訂正後
88	併用禁忌	ダビガトラン	削除
93	Exercise6	・テオフィリンを服用している患者が禁煙をした場合～	・テオフィリンを服用している患者が喫煙をした場合～
228	問 17 選択肢 1	～などの8疾患である。	～などの 11 疾患である。
	問 17 解説文 1	～結核の全8疾患である。	～結核、Hib 感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）の 11 疾患である。
419	問 21 選択肢 5	薬物治療を受けている女性が妊娠を望む場合には、受精や胎児の影響を考慮して服	薬物治療を受けている女性が妊娠を望む場合には、受精や胎児の影響を考慮して服薬を必ず中止するように説明する。
460	Exercise6	（① ピーク値・ピーク値トラフ値～	（① トラフ値・ピーク値トラフ値～
493	問 22 解説文 2	削除（差し替え）	×：後発医薬品の承認申請時に苛酷試験の資料は不要である。医薬品の安定性を調べる試験には、苛酷試験、長期保存試験及び加速試験がある。苛酷試験は、流通の間に遭遇する可能性のある苛酷な条件における品質の安定性に関する情報を得るための試験であり、原体及び製剤からそれぞれ最適量を採取し、原則、包装を除いた状態で行う。
505	問 34 選択肢 5	追加	5 フルマゼニルは、ベンゾジアゼピン系薬の急性中毒に用いられる。
585	問 19-1 解説文 2	～原則として 1 回 14 日分と限度が定められている。フルニトラゼパムのように、医薬品によっては30日または90日を限度とするものもあるが、	～原則として 1 回 14 日分と限度が定められているが、フルニトラゼパムのように、医薬品によっては 30 日または 90 日を限度とするものもある。
588	問 20-1 解説文 2	～の生合成を抑制することにより、凝血効果を発揮する。	～の生合成を抑制することにより、抗凝血効果を発揮する。
608	460 解答	①ピーク値	①トラフ値